

Wirkstoffe:	Pro 100 ml.	Pro 10 ml.	NRV*
VITAMIN B6 / (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE)	7 mg	0.7 mg	50%
VITAMIN B2 / (RIBOFLAVIN)	7 mg	0.7 mg	50%
VITAMIN B1 / (THIAMINE HYDROCHLORIDE)	5.5 mg	0.55 mg	50%
VITAMIN B12 / (CYANOCOBALAMIN, MANNITOL)	12.5 mcg	1.25 mcg	50%
STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS	10*10 ⁹ viable cells	1*10 ⁹ viable cells	
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	10*10 ⁹ viable cells	1*10 ⁹ viable cells	
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS	10*10 ⁹ viable cells	1*10 ⁹ viable cells	
POLIDEXTROSEL-carnitine	20g	2g	

*NRVs Nährstoff-Referenzwerte /

ZUTATEN FLASCHE: WASSER, POLIDEXTROSE, APFELSaft, SÄUERUNGSMITTEL: ZITRONENSÄURE; KONSERVIERUNGSMITTEL: KALIUMSORBAT, NATRIUMBENZOAT; AROMA, SÜSSSTOFF: SUCRALOSE

ZUTATENKAPPE: MALTODEXTRIN, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS Z57 LMG P-21908, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS DSM 17742 (MAISSTÄRKE), LACTOBACILLUS RHAMNOSUS DSM 21690 (MAISSTÄRKE), ANTIKLEBMITTEL: SILIZIUMDIOXID, MAGNESIUMSTEARAT; VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN, MANNIT), VITAMIN B6 (PYRIDOXINHYDROCHLORID), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B1 (THIAMINHYDROCHLORID).

Beschreibung

Vitamin B1 – beeinflusst den Kohlendioxidgehalt, erhöht den Muskeltonus der Knochen, stimuliert die Aktivität der nützlichen Drüsen, spielt eine wichtige Rolle im Kohlenhydratstoffwechsel, Protein- und Flüssigkeitsstoffwechsel.

Vitamin B2 – beeinflusst das Fett.

Vitamin B6 – enthält Vitamin B, Aminosäuren und Säure. Ein Mangel an Vitamin B6 wird durch den Verzehr von Proteinen und Aminosäuren verursacht, wie z. B. bei der Herstellung von Keksen und Biskuits.

Vitamin B12 entsteht bei der Synthese einer komplexen Aminosäure namens Bei der Backfunktion aktiviert das Nervensystem diesen Prozess und aktiviert die Serie, den Stoffwechsel und die Lipide. Vitamin B12 kann dem Backprozess hinzugefügt werden, insbesondere wenn Sie an einer Diät arbeiten. Vitamin B12 erhöht Anämie und degenerative Auswirkungen des Nervengewebes.

Lactobacillus sind eine Bakteriengattung aus der Familie der Lactobacillus, zu der grampositive, nicht sporenbildende, anaerobe Lactobacilli gehören, die Kohlenhydrate zu Milchsäure zersetzen. Die von ihnen geschaffene saure Umgebung fördert die Entwicklung von Bifidobakterien, die 85-95 % der Darmbiozönose und der anderen normalen Mikroflora des menschlichen Körpers ausmachen.

Die Wirkung von Lactobacillus acidophilus besteht in der Bildung von Milchsäure, die einen niedrigen Säuregehalt der Umgebung gewährleistet und ungünstige Bedingungen für das Leben säureempfindlicher pathogener und opportunistischer Bakterien (Staphylokokken, Proteus, enteropathogene E. coli) schafft.

Der Stamm Lactobacillus rhamnosus bleibt nach der Passage durch den Magen-Darm-Trakt lebensfähig und kann aufgrund der anatomischen Nähe des Anus und des Scheidenvorhofs die Urogenitalzone erfolgreich besiedeln und pathogene Mikroflora verdrängen.

Lactobacillus-Produkte verbessern Stoffwechselvorgänge, verhindern die Entstehung langwieriger Formen von Darmerkrankungen und erhöhen die unspezifische Abwehr des Körpers.

Der grampositive Keim Streptococcus thermophilus („Wärme liebende kettenförmige Beeren“) ist ein bekanntes gutartiges Bakterium, dessen Einnahme insbesondere zur Unterstützung des Darms, z.B. nach Antibiotika-Einnahme, empfohlen wird.

Grund für diese wohltuende Wirkung ist neben der Milchsäurebildung und der pH-Wert-Absenkung das sogenannte Bacteriocin. Bacteriocin ist der Überbegriff für eine ganze Reihe von Wirkstoffen (z.B. thermophil), die das Wachstum anderer („schlechter“) Bakterien oder Pilze hemmen können. Damit ist die Einnahme von Streptococcus thermophilus ideal for supporting digestion and the microbiome. Vegans can also benefit from this.

Anwendungsgebiete:

Probowelin wird als Hilfsmittel bei funktionellen Darmerkrankungen empfohlen, darunter: Diarrhö (Durchfall), Dyspepsie (Verdauungsstörungen), Verstopfung, Flatulenz (Aufgeblähtsein), Übelkeit, Aufstoßen, Erbrechen, Bauchschmerzen; als Adjuvans während und/oder nach der Einnahme von Medikamenten, die Veränderungen der qualitativen oder quantitativen Zusammensetzung der Mikroflora des Magen-Darm-Trakts verursachen können; als Vorbeugung von Darmerkrankungen bei Klima- und Aufenthaltsortwechsel; während einer Zeit erhöhter Infektionsanfälligkeit. Empfohlen zur Wiederherstellung und Normalisierung der Darmmikroflora, Verbesserung der Verdauung, Steigerung der Immunität und der allgemeinen Widerstandskraft sowie als zusätzliche Quelle für probiotische Mikroorganismen, Bioflavonoide und B-Vitamine. Empfohlen zur Steigerung der Milchlaktosetoleranz, Verbesserung des Hautzustands, in der komplexen Therapie zur Eradikation von H. pylori, Verbesserung des Zustands des chronischen Müdigkeitssyndroms, in Kombination mit urogenitalen Infektionen bei Frauen, Steigerung der Immunität und der allgemeinen Widerstandskraft des Körpers gegen Krankheiten.

Anwendungsbereich:

Als Nahrungsergänzungsmittel als Quelle für probiotische Mikroorganismen sowie B-Vitamine

Gebrauchsanweisung und Dosierung

Die empfohlene Dosis beträgt 1-2 Flaschen pro Tag.

Behandlungsdauer – bis zu 1 Monat. Bei Bedarf kann die Einnahme wiederholt werden.

Anleitung zur Verwendung der Fläschchen:

Foto 1. - Stecken Sie den Schlüssel in die Produktabdeckung.

Foto 2. - Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, bis der Inhalt in die Flasche gegossen ist.

Foto 3. - Schütteln Sie die Flasche.

Foto 4. - Nehmen Sie den Deckel ab und trinken Sie den Inhalt.

Achtung:

Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil.

Kontraindikationen:

Individuelle Unverträglichkeit gegenüber den Produktbestandteilen.

Abgabeform und Verpackung:

10 ml Flasche (8 Flaschen) mit Gebrauchsanweisung im Karton.

Lagerbedingungen: Kühl, trocken und dunkel lagern.

Haltbarkeit: 2 Jahre. Herstellungsdatum und Seriennummer sind auf der Verpackung aufgedruckt.

Verkaufsbedingungen:

Über eine Apothekenkette und Fachgeschäfte, Abteilungen einer Einzelhandelskette.